

## Presença de aves anilhadas na Reserva Natural Local do Estuário do Douro uma “Caixa de Pandora” cheia de surpresas

Apresenta-se de seguida alguns casos ilustrativos:

### 1º Caso: Um Colhereiro holandês que escolheu a RNLED como local a visitar



Colhereiro (*Platalea leucorodia*) - 18 Fevereiro de 2010 RNLED

Historial de um Colhereiro anilhado que tem frequentado a RNLED durante os últimos três anos.

Nasceu a 9 de Julho 2008
4 a 18 de Outubro 2008 estava em Texel Holland (a 45 Km) do local onde nasceu (Onderdijk)
De 2 de Novembro 2008 até 1 de Março 2009 esteve no Estuário do Douro
Em 12 Outubro 2009 (com um ano e quase três meses de idade) foi visto no País Basco em Irun
Foi visto no estuário a 14 de Nov 2009 em Jan 2010 e a 18 de Fev 2010 (com um ano e meio de idade)

### 2º Caso: Uma gaivota-de-asa-escura frequentadora da zona da Foz do Douro

*Larus fuscus* (idade actual): 4 anos e 11 meses

Local de nascimento Bristol – Inglaterra

Data de nascimento: Outubro de 2005

**Historial:** Resumo de registos mensais em Portugal (n=18):

Esta gaivota chega a Portugal em meados de Setembro, permanece durante o Inverno, e regressa a Inglaterra em meados de Março.

Permanece meio ano em Portugal (Inverno) e outro meio ano na terra natal, em Inglaterra

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez

(a verde período de permanência em Portugal incluindo a RNLED e zona envolvente)

### 3º Caso: Uma das várias gaivotas-de-asa-escura oriundas do Mar-de-Wadden



*Larus fuscus intermedius* adulto - 24 Set 2009 RNLED  
Ave proveniente da Holanda anilhada por Norman van Swelm

### 4º Caso: Gaivota recuperada em Centro de Recuperação Galego procura refúgio na RNLED

No final do mês de Julho foi registada a presença na RNLED de uma gaivota imatura da espécie (*Larus michahellis*) com a anilha de leitura à distância 203 M, sendo o primeiro registo efectuado desta ave recuperada no centro de Recuperação de Cotorredondo, na Galiza e posta em liberdade a 11 de Novembro do ano passado nas Salinas de Villaboa (Ria de Vigo-Pontevedra).

Esta gaivota, proveniente de um ninho em zona urbana, é uma entre várias que estão a ser alvo de um programa de seguimento por parte do Centro de recuperação Galego.



30 de Julho 2010 – **203M**

## 5º Caso: Gaivota-de-cabeça-preta uma espécie a destacar...

A RNLED é comprovadamente um local importante de utilização da gaivota-do-mediterrâneo (*Larus melanocephalus*) espécie de gaivota encontra-se incluída no Anexo I (**que inclui as espécies de aves de interesse comunitário cuja conservação requer a designação de zonas de protecção especial**) da Directiva Habitats (Dec.-lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro).

É uma das gaivotas do grupo das Gaivotas-de-Capuz (HG) mais atraentes que se pode observar na RNLED. Na Primavera e Verão quando apresentam a sua plumagem nupcial são especialmente atraentes, os adultos possuem a cabeça preta, com uma auréola branca a envolver o olho, destacando-se um forte contraste com o bico vermelho com barra preta e patas vermelhas.

Há mais de 80 anos Tait dava esta espécie como de presença muito escassa em Portugal, não havendo registos para a zona do Grande Porto nem estuário do Douro (pouco se conhecia sobre esta espécie).

O ano passado e este ano (últimos 18 meses), esta espécie foi registada na RNLED tanto no período pós-reprodutor (Junho a Outubro) como na passagem Primavera (Março a Maio), assim como de Inverno (Novembro a Fevereiro), sendo estimada a ocorrência neste dois anos de mais de 150 aves desta espécie.

De seguida regista-se uma destas aves observada na RNL Estuário do Douro em Junho e Agosto de 2010, anilhado em cria a 25 de Junho de 2007 em Oye Plage (Pas-de-Calais – França).



9 August 2010



27 July 2010

Place: Reserva Natural Local Estuário do Douro - Vila nova de Gaia - Portugal


**6º Caso: De Reserva Natural em Reserva Natural ...**





10 de Agosto de 2010 – R.N.L.Estuário do Douro – V.N. Gaia – Portugal  
Último registo foi realizado a 14 de Setembro de 2010.


*Guincho (Chroicocephalus ridibundus)* que efectuou uma viagem de pelo menos 1400 Km. Esta ave proveniente de uma colónia reprodutora na Reserva Natural de Molsbroek (RNM) na Bélgica a 20 Km de Antuérpia passa o inverno na RNLED e regressa RNM em meados de Março. Comprova assim a importância das Reserva Naturais como locais de refúgio e reprodução de aves migradoras.



## LISTAGEM ACTUALIZADA DE AVES CUJA OCORRÊNCIA ESTÁ REGISTRADA PARA O ESTUÁRIO DO RIO DOURO (RNLED)


Os nomes científicos seguem recomendações taxonómicas do TAC  
(Taxonomic Advisory Committee)

<b>GAVIIFORMES (2)</b>	
<b>Gaviidae (2)</b>	
<i>Gavia stellata</i> (Pontoppidan) 1763	<b>Mobêlha-pequena</b>
<i>Gavia ártica</i> (Linnaeus) 1758	<b>Mobêlha-de-garganta-preta</b>
<b>PODICIPEDIFORMES (3)</b>	
<b>Podicipedidae (3)</b>	
<i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Mergulhão-de-crista</b>
<i>Podiceps nigricollis</i> Brehm 1832	<b>Mergulhão-de-pescoço-preto</b>
<i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas) 1764	<b>Mergulhão-pequeno</b>
<b>PROCELLARIIFORMES (4)</b>	
<b>Hydrobatidae (1)</b>	
<i>Oceanodroma leucorhoa</i> (Vieillot) 1818	<b>Painho-de-cauda-forcada</b>
<b>Procellariidae (3)</b>	
<i>Calonectris diomedea</i> (Scopoli) 1769	<b>Pardela-de-bico-amarelo</b>
<i>Puffinus griseus</i> (Gmelin) 1789	<b>Pardela-preta</b>
<i>Puffinus mauretanicus</i> Lowe 1921	<b>Pardela-sombria</b>
<b>PELECANIFORMES (3)</b>	
<b>Sulidae (1)</b>	
<i>Morus bassanus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Ganso-patola</b>
<b>Phalacrocoracidae (2)</b>	
<i>Stictocarbo aristotelis</i> (Linnaeus) 1761	<b>Corvo-marinho-de-crista</b>
<i>Phalacrocorax carbo</i> (Linnaeus) 1758	<b>Corvo-marinho-de-faces-brancas</b>
<b>CICONIFORMES (6)</b>	
<b>Threskiornithidae (1)</b>	
<i>Platalea leucorodia</i> Linnaeus 1758	<b>Colhereiro</b>
<b>Ardeidae (5)</b>	
<i>Egretta garzetta</i> (Linnaeus) 1758	<b>Garça-branca-pequena</b>
<i>Ardea cinerea</i> Linnaeus 1758	<b>Garça-real</b>
<i>Ardea purpurea</i> Linnaeus 1766	<b>Garça-vermelha</b>
<i>Ardeola ralloides</i> (Scopoli, 1769)	<b>Papa-ratos</b>
<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus) 1758	<b>Garça-boieira</b>
<b>PHOENICOPTERIFORMES (1)</b>	
<b>Phoenicopteridae (1)</b>	
<i>Phoenicopus roseus</i> Linnaeus 1758	<b>Flamingo-comum</b>
<b>ANSERIFORMES (17)</b>	
<b>Anatidae (17)</b>	



PARQUE  
BIOLÓGICO  
GAIA


<b>Anatini (14)</b>	
<i>Anas acuta</i> Linnaeus 1758	<b>Arrábio</b>
<i>Anas platyrhynchos</i> Linnaeus 1758	<b>Pato-real</b>
<i>Anas clypeata</i> Linnaeus 1758	<b>Pato-trombeteiro</b>
<i>Anas crecca</i> Linnaeus 1758	<b>Marrequinha</b>
<i>Anas penelope</i> Linnaeus 1758	<b>Piadeira</b>
<i>Anas querquedula</i> Linnaeus 1758	<b>Marreco</b>
<i>Anas strepera</i> Linnaeus 1758	<b>Frisada</b>
<i>Aythya ferina</i> (Linnaeus) 1758	<b>Zarro-comum</b>
<i>Netta rufina</i> (Pallas) 1773	<b>Pato-de-bico-vermelho</b>
<i>Anser anser</i> (Linnaeus) 1758	<b>Ganso-bravo</b>
<i>Anser albifrons</i> (Scopoli) 1769	<b>Ganso-grande-de-testa-branca</b>
<i>Branta bernicla</i> (Linnaeus) 1758	<b>Ganso-de-faces-negras</b>
<i>Branta leucopsis</i> (Bechstein) 1803	<b>Ganso-de-faces-brancas</b>
<i>Somateria mollissima</i> (Linnaeus) 1758	<b>Éider</b>
<b>Mergini (2)</b>	
<i>Melanitta nigra</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pato-negro</b>
<i>Mergus serrator</i> Linnaeus 1758	<b>Merganso-de-poupa</b>
<b>Tadornini (1)</b>	
<i>Tadorna tadorna</i> (Linnaeus) 1758	<b>Tadorna</b>
<b>ACCIPITRIFORMES (5)</b>	
<b>Accipitridae (4)</b>	
<i>Buteo buteo</i> (Linnaeus) 1758	<b>Águia-d'asa-redonda</b>
<i>Accipiter nisus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Gavião</b>
<i>Accipiter gentilis</i> (Linnaeus) 1758	<b>Açor</b>
<i>Milvus migrans</i> (Boddaert) 1783	<b>Milhafre-preto</b>
<b>Pandionidae (1)</b>	
<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Águia-pesqueira</b>
<b>FALCONIFORMES (2)</b>	
<b>Falconidae (2)</b>	
<i>Falco tinnunculus</i> Linnaeus 1758	<b>Peneireiro</b>
<i>Falco peregrinus</i> Tunstall 1771	<b>Falcão-peregrino</b>
<b>GRUIFORMES (3)</b>	
<b>Rallidae (3)</b>	
<i>Fulica atra</i> Linnaeus 1758	<b>Galeirão</b>
<i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Galinha-d'água</b>
<i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus 1758	<b>Frango-d'água</b>
<b>CHARADRIIFORMES (63)</b>	
<b>CHARADRII (35)</b>	
<b>Haematopodidae (1)</b>	
<i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus 1758	<b>Ostraceiro</b>
<b>Recurvirostridae (2)</b>	
<i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus 1758	<b>Alfaiate</b>
<i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Perna-longa</b>
<b>Glareolidae (1)</b>	
<i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus) 1766	<b>Perdiz-do-mar</b>
<b>Charadriidae (8)</b>	



PARQUE  
BIOLÓGICO  
GAIA

<i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus 1758	<b>Borrenho-de-coleira-interrompida</b>
<i>Charadrius dubius</i> Scopoli 1786	<b>Borrelho-pequeno-de-coleira</b>
<i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus 1758	<b>Borrelho-grande-de-coleira</b>
<i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Tarambola-carambola</b>
<i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus) 1758	<b>Tarambola-dourada</b>
<i>Pluvialis dominica</i> (Müller) 1776	<b>Tarambola-dourada-pequena</b>
<i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus) 1758	<b>Tarambola-cinzenta</b>
<i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Abibe</b>
<b>Scolopacidae (23)</b>	
<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot) 1819	<b>Pilrito-peitoral</b>
<i>Calidris alba</i> (Pallas) 1764	<b>Pilrito-das-praias</b>
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pilrito-de-peito-preto</b>
<i>Calidris canutus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Seixoeira</b>
<i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan) 1763	<b>Pilrito-de-bico-comprido</b>
<i>Calidris minuta</i> (Leisler) 1812	<b>Pilrito-pequeno</b>
<i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus) 1758	<b>Narceja</b>
<i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich) 1764	<b>Narceja-galega</b>
<i>Limosa limosa</i> (Linnaeus) 1758	<b>Maçarico-de-bico-direito</b>
<i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus) 1758	<b>Fuselo</b>
<i>Numenius arquata</i> (Linnaeus) 1758	<b>Maçarico-real</b>
<i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Maçarico-galego</b>
<i>Philomachus pugnax</i> (Linnaeus) 1758	<b>Combatente</b>
<i>Tringa erythropus</i> (Pallas) 1764	<b>Perna-vermelha-escuro</b>
<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin) 1789	<b>Perna-amarela-pequeno</b>
<i>Tringa glareola</i> Linnaeus 1758	<b>Maçarico-bastardo</b>
<i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus) 1767	<b>Perna-verde-comum</b>
<i>Tringa ochropus</i> Linnaeus 1758	<b>Pássaro-bique-bique</b>
<i>Tringa totanus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Perna-vermelha-comum</b>
<i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus) 1758	<b>Maçarico-das-rochas</b>
<i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus) 1758	<b>Rola-do-mar</b>
<i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Falaropo-de-bico-fino</b>
<i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus) 1758	<b>Falaropo-de-bico-grosso</b>
<b>LARII (25)</b>	
<b>Stercorariidae (3)</b>	
<i>Catharacta skua</i> Brünnich 1764	<b>Moleiro-grande</b>
<i>Stercorarius parasiticus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Moleiro-pequeno</b>
<i>Stercorarius pomarinus</i> (Temminck) 1815	<b>Moleiro-do-ártico</b>
<b>Laridae (16)</b>	
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan 1763	<b>Gaivota-argêntea</b>
<i>Larus cacchianans michahellis</i> Pallas 1811	<b>Gaivota-de-patas-amarelas</b>
<i>Larus canus</i> Linnaeus 1758	<b>Gaivota-parda</b>
<i>Larus delawarensis</i> Ord 1815	<b>Gaivota-de-bico-riscado</b>
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus 1758	<b>Gaivota-de-asa-escura</b>
<i>Larus glaucoides</i> Meyer 1822	<b>Gaivota-polar</b>
<i>Larus hyperboreus</i> Gunnerus 1767	<b>Gaivota-hiperbórea</b>
<i>Larus marinus</i> Linnaeus 1758	<b>Alcatraz</b>
<i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus) 1758	<b>Guincho-americano</b>






PARQUE  
BIOLÓGICO  
GAIA

<i>Larus melanocephalus</i> Temminck 1820	<b>Gaivota-de-cabeça-preta</b>
<i>Larus smithsonianus</i> Coues, 1862	<b>Gaivota-argentea-americana</b>
<i>Hydrocoloeus minutus</i> Pallas 1776	<b>Gaivota-pequena</b>
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> Linnaeus 1766	<b>Guincho-comum</b>
<i>Larus audouinii</i> Payraudeau 1826	<b>Gaivota de Audouin</b>
<i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus) 1758	<b>Gaivota-tridáctila</b>
<i>Xema sabini</i> (Sabine) 1819	<b>Gaivota-de-sabine</b>
<b>Sternidae (6)</b>	
<i>Chlidonias hybridus</i> (Pallas) 1811	<b>Gaivina-de-faces-brancas</b>
<i>Chlidonias niger</i> (Linnaeus) 1758	<b>Gaivina-preta</b>
<i>Sternula albifrons</i> (Pallas 1764)	<b>Andorinha-do-mar-anã</b>
<i>Sterna hirundo</i> Linnaeus 1758	<b>Andorinha-do-mar-comum</b>
<i>Sterna paradisaea</i> Pontoppidan 1763	<b>Andorinha-do-mar-ártica</b>
<i>Thalasseus sandvicensis</i> (Latham) 1787	<b>Garajau-comum</b>
<b>ALCAE (3)</b>	
<b>Alcidae (3)</b>	
<i>Uria aalge</i> (Pontoppidan) 1763	<b>Arau-comum</b>
<i>Alca torda</i> Linnaeus 1758	<b>Torda-mergulheira</b>
<i>Fratercula artica</i> (Linnaeus) 1758	<b>Papagaio-do-mar</b>
<b>COLUMBIFORMES (4)</b>	
<b>Columbidae (4)</b>	
<i>Columba livia</i> Gmelin 1789	<b>Pombo-das-rochas</b>
<i>Columba palumbus</i> Linnaeus 1758	<b>Pombo-trocaz</b>
<i>Streptopelia decaocto</i> (Frivaldszky) 1838	<b>Rola-turca</b>
<i>Streptopelia turtur</i> (Linnaeus) 1758	<b>Rola-brava</b>
<b>STRIGIFORMES (4)</b>	
<b>Tytonidae (1)</b>	
<i>Tyto alba</i> (Scopoli) 1769	<b>Coruja-das-torres</b>
<b>Strigidae (3)</b>	
<i>Strix aluco</i> Linnaeus 1758	<b>Coruja-do-mato</b>
<i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan) 1763	<b>Coruja-do-nabal</b>
<i>Athene noctua</i> (Scopoli) 1769	<b>Mocho-galego</b>
<b>APODIFORMES (2)</b>	
<b>Apodidae (2)</b>	
<i>Apus apus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Andorinhão-preto</b>
<i>Apus pallidus</i> (Shelley) 1855	<b>Andorinhão-pálido</b>
<b>CORACIIFORMES (2)</b>	
<b>Upupidae (1)</b>	
<i>Upupa epops</i> Linnaeus 1758	<b>Poupa</b>
<b>Alcedinidae (1)</b>	
<i>Alcedo atthis</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pica-peixe</b>
<b>PICIFORMES (1)</b>	
<b>Picidae (1)</b>	
<i>Picus viridis</i> Linnaeus 1758	<b>Peto-verde</b>
<b>PASSERIFORMES (53)</b>	
<b>Alaudidae (2)</b>	



PARQUE  
BIOLÓGICO  
GAIA


<i>Alauda arvensis</i> Linnaeus 1758	Laverca
<i>Calandrella brachydactyla</i> (Leisler) 1814 (= <i>Calandrella cinerea</i> )	Calhandrinha
<b>Hirundinidae (4)</b>	
<i>Delichon urbicum</i> (Linnaeus) 1758	Andorinha-dos-beirais
<i>Cecropis daurica</i> (Linnaeus) 1771	Andorinha-dáurica
<i>Hirundo rustica</i> Linnaeus 1758	Andorinha-das-chaminés
<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus) 1758	Andorinha-dos-beirais
<b>Motacillidae (6)</b>	
<i>Anthus</i> spp. [ <i>spinoletta</i> (Linnaeus) 1758/ <i>petrosus</i> (Montagu) 1798 ]	Petinha ribeirinha/Petinha-maritima
<i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus) 1758	Petinha-dos-prados
<i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus) 1758	Petinha-das-árvores
<i>Motacilla alba</i> Linnaeus 1758	Lavandisca-branca
<i>Motacilla cinerea</i> Tunstall 1771	Lavandisca-cinzenta
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758	Lavandisca-amarela
<b>Troglodytidae (1)</b>	
<i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus) 1758	Carriça
<b>Prunellidae (1)</b>	
<i>Prunella modularis</i> Linnaeus 1758	Ferreirinha
<b>Turdidae (9)</b>	
<i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus) 1758	Pisco-de-peito-ruivo
<i>Luscinia svecica</i> (Linnaeus) 1758	Pisco-de-peito-azul
<i>Phoenicurus ochrurus</i> (Gmelin) 1774	Rabirruivo
<i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus) 1758	Cartaxo-nortenho
<i>Saxicola torquatus</i> (Linnaeus) 1766	Cartaxo-comum
<i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus) 1758	Chasco-cinzento
<b>Turdinae</b>	
<i>Turdus merula</i> Linnaeus 1758	Melro-comum
<i>Turdus philomelos</i> Brehm 1831	Tordo-comum
<i>Turdus iliacus</i> Linnaeus 1766	Tordo-ruivo
<b>Sylviidae (9)</b>	
<b>Acrocephalinae</b>	
<i>Acrocephalus paludicola</i> (Vieillot) 1817	Felosa-aquática
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus) 1758	Felosa-dos-juncos
<i>Acrocephalus scirpaceus</i> (Hermann) 1804	Rouxinol-pequeno-do-caniços
<i>Hippolais polyglotta</i> (Vieillot) 1817	Felosa-poliglota
<b>Sylviinae</b>	
<i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus) 1758	Toutinegra-de-barrete-preto
<i>Sylvia melanocephala</i> (J. F. Gmelin, 1789)	Toutinegra-dos-valados
<i>Phylloscopus</i> cf. <i>collybita</i> cf. (Vieillot) 1817	Felosa-comum
<i>Phylloscopus ibericus</i> (Ticehurst, 1937)	Felosa-ibérica
<i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus) 1758	Felosa-musical
<b>Muscicapidae (2)</b>	
<i>Muscicapa striata</i> (Pallas) 1764	Papa-moscas-cinzento
<i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas) 1764	Papa-moscas-preto
<b>Paridae (2)</b>	
<i>Pariparus ater</i> (Linnaeus) 1758	Chapim-carvoeiro



<i>Parus major</i> (Linnaeus) 1758	<b>Chapim-real</b>
<b>Laniidae (1)</b>	
<i>Lanius meridionalis</i> Temminck 1820	<b>Picanço-real</b>
<b>Corvidae (3)</b>	
<i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus) 1758	<b>Gaio</b>
<i>Pica pica</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pega-rabuda</b>
<i>Corvus corone</i> Linnaeus 1758	<b>Gralha-preta</b>
<b>Sturnidae (2)</b>	
<i>Sturnus unicolor</i> Temminck 1820	<b>Estorninho-preto</b>
<i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus 1758	<b>Estorninho-malhado</b>
<b>Passeridae (2)</b>	
<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pardal</b>
<i>Passer montanus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pardal-montês</b>
<b>Fringillidae (6)</b>	
<i>Carduelis carduelis</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pintassilgo</b>
<i>Carduelis chloris</i> (Linnaeus) 1758	<b>Verdelhão</b>
<i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus 1758	<b>Tentilhão</b>
<i>Serinus serinus</i> (Linnaeus) 1766	<b>Chamariz</b>
<i>Carduelis cannabina</i> (Linnaeus) 1758	<b>Pintaroxo</b>
<i>Carduelis spinus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Lugre</b>
<b>Cisticolidae (1)</b>	
<i>Cisticola juncidis</i> (Rafinesque) 1810	<b>Fuíinha-dos-juncos</b>
<b>Emberizidae (1)</b>	
<i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus) 1758	<b>Escrevedeira-schoeniclus</b>
<b>Estrildidae (1)</b>	
<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus) 1758	<b>Bico-de-lacre</b>
<b>6 espécies (consideradas assilvestradas ou fugidas de cativeiro)</b>	
<b>Sturnidae</b>	
<i>Acridotheres tristis</i> (Linnaeus) 1766	<b>Mainato</b>
<b>Phoenicopteridae</b>	
<i>Pnoenicopterus minor</i>	<b>Flamingo-pequeno</b>
<b>Anatidae</b>	
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (Linnaeus) 1766	<b>Ganso-do-Egipto</b>
<i>Anas rubripes</i> Brewster 1902	<b>Pato-escuro-americano</b>
<i>Cygnus cf olor</i> <i>Cygnus atra</i>	<b>Cisnes</b>

### Tabela de subespécies registadas (Estuário Douro)

<b>Espécie</b>	<b>Subespécies</b>	
<b>Laridae</b>		
<i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758	<i>graellsii</i> A. E. Brehm, 1857	<b>Gaivota –do-Mar-da-Noruega</b>
	<i>intermedius</i> Schiøler, 1922	<b>Gaivota-do-Mar-do-Norte</b>
	<i>fuscus</i> Linnaeus, 1758	<b>Gaivota-do-Báltico</b>
<i>Larus argentatus</i> Pontoppidan, 1763	<i>argentatus</i> Pontoppidan, 1763	<b>Gaivota-argentea-do-Norte</b>
	<i>argenteus</i> C. L. Brehm, 1822	<b>Gaivota-argentea-do-Sul</b>



<i>Larus cachinnans</i> Pallas, 1811	<i>michahellis</i> J. F. Naumann, 1840	<b>Gaivota-de-patas-amarelas</b>
<b>Scolopacidae</b>		
<i>Calidris alpina</i> (Linnaeus) 1758	<i>schinzii</i> Brehm, 1822	<b>Pilrito-de-peito-preto – raça da Europa Ocidental</b>
	<i>alpina</i> Linnaeus, 1758	<b>Pilrito-de-peito-preto – raça da escandinávia</b>
<b>Motacillidae</b>		
<i>Motacilla flava</i> Linnaeus 1758	<i>iberiae</i> Hartert, 1921	<b>Lavavndisca-amarela- raça da P. I., Sul França e Baleares</b>

**Total : 175 + 6 = 181 espécies**

**Distribuídas por 109 géneros e 47 Famílias pertencentes a 17 Ordens diferentes**

Compilação até Outubro de 2010